



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

19.07.2018 № 014-1776/18

На № _____ от _____

О новых данных по безопасности
лекарственного препарата
Реатаз



2239639

Субъекты обращения
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ООО «Бристол-Майерс Сквибб» о новых данных по безопасности лекарственного препарата «Реатаз (МНН: атазанавир) капсулы 150 мг, 200 мг, 300 мг».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко



Bristol-Myers Squibb

Zemlaynoi Val, bld. 9
105064 Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 755-92-67, Fax +7 (495) 755-92-62

Москва 03.06.2018
№ 149 РЕГ

Специалистам здравоохранения

Информационное письмо

Уважаемый специалист здравоохранения,

Настоящим ООО «Бристол-Майерс Сквибб», Россия выражает свое уважение информирует о новой информации, связанной с безопасностью лекарственного препарата (ЛП) **Реатаз® (МНН – атазанавир), капсулы 150, 200 мг, РУ ЛС-000029 от 26.01.2010 и Реатаз® (МНН – атазанавир), капсулы 300 мг, РУ ЛП-000635 от 26.09.2011.**

Обновление информации по безопасности представлено ниже:

Раздел «Противопоказания»

Противопоказано совместное применение атазанавира/ритонавира с луразидоном.

Противопоказано совместное применение атазанавира с глекапревиром/пибрентасвиром.

Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие формы взаимодействия»

Не рекомендуется совместное применение атазанавира/ритонавира совместно с луразидоном ввиду развития серьезных и/или жизнеугрожающих побочных реакций. При совместном применении атазанавира с луразидоном необходимо снижение дозы луразидона.

Не рекомендуется совместное применение атазанавира с глекапревиром/пибрентасвиром ввиду увеличения риска повышения активности АЛТ в связи с ростом концентрации глекапревира и пибрентасвира в плазме крови.

Не рекомендуется совместное применение фиксированной комбинации софосбувир/велпатасвир/воксилапревир с атазанавиром ввиду повышения концентрации воксилапревира в плазме крови.

С уважением,

Старший менеджер отдела регистрации и качества

ООО «Бристол-Майерс Сквибб»



Н.Ю. Орешникова